

Ditranol/salicylzuur-collodium (202)

Nummer 202

Werking en toepassingen

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

De werkzame stoffen in Ditranol/salicylzuur-collodium FNA zijn ditranol en salicylzuur.

Ditranol remt de groei van huidcellen af, waardoor het de groei van wratten remt. Salicylzuur werkt in op de hoornlaag van de huid. De hoornlaag is het bovenste laagje van de huid. Salicylzuur weekt dit laagje van de huid los en bevordert een normale groei van de huid.

Artsen schrijven deze combinatie voor bij wratten.

Bijwerkingen

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms

- Droge huid en irritatie van de behandelde plekken en de omringende huid. Dit uit zich in een brandend en stekend gevoel, roodheid en soms jeukende uitslag. Neem contact op met uw arts, wanneer u last blijft houden van huidirritatie.
- Pijn, doordat de wrat verhardt, wat bij aanraking of stoten pijnlijk is. De wrat kan ook breken.
- Paarsbruine verkleuring van huid, nagels, kleding en textiel. De verkleuring van de huid verdwijnt meestal na één à twee weken vanzelf. De nagelverkleuring groeit vanzelf uit. De vlekken in textiel zijn niet te verwijderen.

Zelden

- U kunt de gezonde huid beschadigen als het middel er op komt. Bescherm daarom de gezonde huid, door op de gezonde huid rond de wrat een beetje vaseline te smeren.
- Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg uw arts als u last heeft van deze verschijnselen. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor ditranol/salicylzuur-collodium. Het apothekerteam kan er dan op letten dat u het middel of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Hoe, wanneer en hoelang?

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Gebruik dit middel niet in het gezicht of bij wondjes. Laat het middel niet in het oog of op de oogleden komen. Dit kan beschadigingen geven. Komt het per ongeluk in het oog, de neus, mond of een wondje, spoel dan goed met water om het middel te verwijderen.

- Week de wrat zo mogelijk vijf minuten in warm water en droog daarna goed af.
- Dek de omliggende huid eventueel af met een beetje vaseline, om de gezonde huid tegen irritatie te beschermen.
- Bedek de wrat met een paar druppels aanstipvloeistof met een penseeltje of wattenstaafje en laat de vloeistof opdrogen.
- Plak na het aanstippen de wrat eventueel af met een stukje pleister of tape.
- Brengt u de aanstipvloeistof op de handen aan? Pas dan op dat u niet in de ogen wrijft, want slechts een klein beetje aanstipvloeistof kan de oogleden erg irriteren.
- Sluit het flesje goed af, om verdampen van de inhoud te voorkomen. Het is kort houdbaar. Kijk op het etiket voor de uiterste gebruiksdatum.
- Dit middel is brandbaar. Pas daarom op met gebruik in de nabijheid van open vuur, zoals de geiser.
- Let op: dit middel maakt paarsbruine vlekken op onder andere kleding en beddengoed.

Wanneer?

Gebruik de aanstipvloeistof eenmaal per dag, bijvoorbeeld 's avonds. Als de plek door de behandeling erg pijnlijk wordt, kunt u één of twee dagen overslaan.

Hoelang?

Ga door tot de wrat helemaal weg is. Meestal is dat na enkele weken, soms moet u de behandeling herhalen. Een enkele keer kan het enkele maanden duren voor de wrat weg is.

Wanneer dit geneesmiddel niet helpt of wanneer de klachten zich herhalen, vraag dan advies aan uw arts.

Dosis vergeten?

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Een keer vergeten is niet zo erg. Probeer zo veel mogelijk uw normale schema te volgen, dan heeft u sneller resultaat.

Wanneer u te veel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

Autorijden, alcohol, voeding

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

autorijden, alcohol drinken en alles eten?

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Wisselwerking

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Zwangerschap en borstvoeding

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

Borstvoeding

Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Wanneer niet gebruiken

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?

U mag dit middel niet gebruiken

- Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op ditranol of salicylzuur of middelen die hierop lijken.
- Bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Zie voor meer informatie ook de rubrieken 'Zwangerschap en borstvoeding' en 'Bijwerkingen'.

Stoppen

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

Samenstelling

Wat zit er in dit medicijn?

Ditranol/salicylzuur-collodium FNA bevat per gram 30 mg ditranol en 250 mg salicylzuur. Verder bevat het collodium aceton, dl-alfa-tocoferol, ethanol, ether, pyroxyline en ricinusolie.

Bewaren

Hoe moet ik dit medicijn bewaren?

Bewaar de collodium beneden 25 °C, niet in de vriezer. Sluit de collodium na gebruik goed af. Dit voorkomt verdampen. De collodium is dan houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op het etiket staat.

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw apotheker.

Datum laatste wijziging: 27-08-2012

Deze tekst is opgesteld door het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, onderdeel van de KNMP. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de tekst op www.apotheek.nl. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

