

Ditranolsalicylzuurcollodium FNA

Werking en toepassingen

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

De werkzame stof in ditranolsalicylzuurcollodium is ditranol.

Dit middel wordt gebruikt bij wratten. Salicylzuur weekt het bovenste laagje van de huid los en ontsmet de wrat. Ditranol remt de groei van de wrat.

Soms duurt het een paar maanden voor de wrat helemaal weg is.

Bijwerkingen

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (1-10%)

- Irritatie, jeuk, roodheid en branderig gevoel van de omringende huid.
- De plek van aanbrengen (huid, haren en nagels) verkleurt paarsbruin. De verkleuring verdwijnt binnen één tot twee weken na stoppen van de behandeling.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Hoe, wanneer en hoelang?

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek en volg de aanwijzingen van de arts op.

Gebruikelijke dosering: 1 x per dag de wrat met een paar druppels aanstipvloeistof bedekken. Doe dit als volgt:

- Week de wrat (zo mogelijk) 5 minuten in warm water en droog daarna goed af.
- Schud voor gebruik de aanstipvloeistof goed.
- Niet aan brengen in de buurt van open vuur (bijvoorbeeld een geiser) omdat dit middel brandbaar is.
- Vermijd contact met ogen, neus, mond, slijmvliezen en wondjes.
- Bedek de wrat met één of meer druppels aanstipvloeistof. Probeer te voorkomen dat er aanstipvloeistof op de huid rondom de wrat terechtkomt. Dek eventueel de huid rondom de wrat met vaseline af.
- Laat de druppels opdrogen totdat er een dun laagje is ontstaan. Plak de wrat zo nodig af met folie of tape.
- Was na gebruik uw handen.

Wanneer?

Probeer de behandeling elke dag op min of meer hetzelfde tijdstip te doen. Dan heeft het middel een constant effect. In verband met het weken van de wrat voorafgaand aan het aanbrengen van de aanstipvloeistof, is het handig om de behandeling na het douchen uit te voeren.

Hoelang?

Uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken.

Ga in principe door met de behandeling totdat de wrat helemaal weg is.

Wanneer dit geneesmiddel niet helpt of wanneer de klachten zich herhalen, vraag dan advies aan uw arts.

Let op: deze aanstipvloeistof geeft blijvende paarse vlekken in kleding en linnengoed.

Dosis vergeten?**Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?**

Gebruik een vergeten dosering zo snel mogelijk alsnog, tenzij het alweer bijna tijd is voor de volgende behandeling. Sla in dat geval de vergeten dosering over en ga verder met het gewone tijdschema. Gebruik geen dubbele hoeveelheden.

Wanneer u te veel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

Autorijden, alcohol, voeding**Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...****autorijden, alcohol drinken en alles eten?**

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Wisselwerking**Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?**

Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de aangedane plekken. U heeft dan kans dat u dit middel met het volgende wegsmeert. Een crème verdwijnt sneller in de huid dan een vette zalf. Smeer daarom altijd eerst het minst vette middel. Wacht tot dit in de huid is getrokken en breng dan het andere middel aan. Dit is meestal binnen een kwartier tot een halfuur.

Zwangerschap en borstvoeding**Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?**

Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u tijdelijk overstappen op een ander middel.

Gebruik dit middel als u borstvoeding geeft alleen na overleg met uw arts of apotheker of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terecht komt en of het schadelijk is voor de baby. Mogelijk kan de arts (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Bij gebruik op de tepel of borst: breng dit middel na het voeden van de baby op de tepel of borst aan. Was de tepel en het gebied rond de tepel goed voor de eerstvolgende borstvoeding.

Wanneer niet gebruiken?

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?

U mag dit middel niet gebruiken

- Op moedervlekken, wijnvlekken of op donkergekleurde of andere vreemd uitzijende wratten waar haar op groeit.
- Op gevoelige huid, dichtbij de ogen, neus, mond, op wonden of op slijmvliezen.
- Wanneer de wrat of de huid ontstoken is.

Pas ook op bij

- Gebruik op tere huidgedeelten, zoals het gezicht, de geslachtsdelen, huidplooiën en de behaarde hoofdhuid. Hier kan sneller irritatie optreden.

Zie voor meer informatie ook de rubrieken 'Bijwerkingen' en 'Zwangerschap en borstvoeding'.

Stoppen

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

Samenstelling

Wat zit er in dit medicijn?

Ditranolsalicylzuurcollodium bevat per gram 30 mg ditranol. Verder bevat het collodium salicylzuur, aceton, ricinusolie, tocoferol (dl-alfa) en collodium.

Bewaren

Hoe moet ik het medicijn bewaren?

Bewaar het collodium beneden de 25 °C, niet in de vriezer. Sluit de flacon na gebruik goed af om verdampen van het oplosmiddel tegen te gaan. Het collodium is houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking staat. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen.

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw apotheker.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door Ziekenhuisapotheek Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 4 april 2013.