

Kaliumpermanganaat 1:5000

Werking en toepassingen

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

De werkzame stof in kaliumpermanganaat 1:5000 is kaliumpermanganaat.

Dit middel wordt gebruikt bij ernstig geïnficeerd eczemateuze afwijkingen en ulcera cruris (open plek of zweer aan het onderbeen).

Kaliumpermanganaat werd door oxidatieve eigenschappen desinfecterend en remt de groei van bacteriën die infecties veroorzaken.

Bijwerkingen

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

- Irritatie van de huid door kaliumpermanganaat.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Hoe, wanneer en hoelang?

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek en volg de aanwijzingen van de arts op.

- Was na gebruik uw handen.

Wanneer?

Verdeel de behandelingen zo goed mogelijk over de dag. Dan heeft het middel een constant effect.

Hoelang?

Uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken.

Wanneer dit geneesmiddel niet helpt of wanneer de klachten zich herhalen, vraag dan advies aan uw arts.

Let op: Kaliumpermanganaat kleurt de huid bruin. Orale inname veroorzaakt misselijkheid, braken, maagbloeding, oedeem, schade aan lever en nieren, cardiovasculaire depressie.

Dosis vergeten?

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Breng het middel dan alsnog aan, tenzij het alweer bijna tijd is voor de volgende behandeling. Het heeft geen zin een dubbele hoeveelheid te smeren. Eventueel kunt u uw schema iets verschuiven, maar zorg daarbij voor een gelijkmatige verdeling over de dag.

Wanneer u te veel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

Autorijden, alcohol, voeding

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan... autorijden, alcohol drinken en alles eten?

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Wisselwerking

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de aangedane plekken. U heeft dan kans dat u dit middel met het volgende wegsmeert.

Zwangerschap en borstvoeding

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Overleg met uw arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden.

Wanneer niet gebruiken?

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?

U mag dit middel niet gebruiken

- Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op kaliumpermanganaat.

Zie voor meer informatie ook de rubrieken 'Bijwerkingen' en 'Zwangerschap en borstvoeding'.

Stoppen

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

Samenstelling

Wat zit er in dit medicijn?

Kaliumpermanganaat 1:5000 bevat per mL 2,1 mg kaliumpermanganaat. Verder bevat de oplossing gedestilleerd water.

Bewaren

Hoe moet ik het medicijn bewaren?

Bewaar de oplossing in de koelkast. Sluit de glazen fles na gebruik goed af. Dit voorkomt uitdroging en bederf. De oplossing is houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking staat. Na aanbreken is de oplossing 24 uur houdbaar. Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen.

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw apotheker.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door Ziekenhuisapothek Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 29 maart 2013.