

## 'Omeprazol'-suspensie

### Werking en toepassingen

#### Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Omeprazol drank bevat het werkzame bestanddeel omeprazol. Het behoort tot de geneesmiddelengroep die 'protonpompremmers' heet. Deze middelen werken door de hoeveelheid zuur die uw maag aanmaakt te verminderen.

Omeprazol drank wordt gebruikt bij de behandeling van de volgende aandoeningen:

Bij volwassenen:

- Gastro-oesofageale refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit uw maag uw slokdarm in (de buis die uw maag met uw keel verbindt) wat pijn, ontsteking en een brandend gevoel geeft.
- Zweren in het bovenste gedeelte van het darmkanaal (twaalfvingerige-darmzweer) of uw maag (maagzweer).
- Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die '*Helicobacter pylori*' heet. Als u hier last van heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en de zweer te laten genezen.
- Zweren veroorzaakt door geneesmiddelen die NSAID's heten (een bepaald type pijnstillers). Omeprazol CF kan ook worden gebruikt om het ontstaan van zweren te voorkomen als u NSAID's gebruikt.
- Een teveel aan zuur in de maag dat wordt veroorzaakt door een goedaardig gezwel in de alvleesklier (het Zollinger-Ellison syndroom).

Bij kinderen:

*Kinderen ouder dan 1 jaar en  $\geq 10$  kg*

- Gastro-oesofageale refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit uw maag uw slokdarm in (de buis die uw maag met uw keel verbindt) wat pijn, ontsteking en een brandend gevoel geeft. Bij kinderen zijn mogelijke verschijnselen van deze ziekte het omhoog komen van de maaginhoud naar de mond (oprispingen), overgeven en een slechte groei.

*Kinderen ouder dan 4 jaar en adolescenten*

- Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die '*Helicobacter pylori*' heet. Als uw kind hier last van heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en de zweer te laten genezen.

### Bijwerkingen

#### Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

**Als u één van de volgende zeldzame maar ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van Omeprazol CF en neem direct contact op met uw arts:**

- Plotselinge piepende ademhaling, opzwellen van uw lippen, tong en keel of lichaam, huiduitslag, flauwvallen of slikproblemen (ernstige allergische reactie).
- Rood worden van uw huid, met blaren of loslatende stukken huid. Ook kunnen er ernstige blaren en bloedingen optreden op uw lippen, ogen, mond, neus en genitaliën. Dit komt mogelijk door het 'syndroom van Stevens-Johnson' of 'toxische epidermale necrolyse'.
- Gele huid, donkere urine en vermoeidheid, wat verschijnselen kunnen zijn van een leveraandoening.

**Vaak**

- Hoofdpijn.
- Maagdarmproblemen: diarree, maagpijn, verstopping, winderigheid (flatulentie).
- Misselijkheid of overgeven.

**Soms**

- Zwelling aan voeten en enkels.
- Verstoorde slaap (slapeloosheid).
- Duizeligheid, tintelend gevoel of 'slapende' lichaamsdelen, slaperigheid.
- Draaiduizeligheid (vertigo).
- Veranderingen in bloedonderzoek bij controle van uw leverfunctie.
- Huiduitslag, bobbelige uitslag (galbulten) en jeukende huid.
- Algehele malaise en gebrek aan energie.

**Zelden voorkomende bijwerkingen**

- Bloedproblemen zoals een vermindering van het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit kan leiden tot zwakte, blauwe plekken of een groter risico op infecties.
- Allergische reacties, soms zeer ernstige, waaronder het opzwellen van de lippen, de tong en de keel, koorts, piepende ademhaling.
- Lage natriumspiegels in uw bloed. Dit kan leiden tot zwakte, overgeven en krampen.
- Geagiteerde, verwarde of depressieve gevoelens.
- Veranderingen in uw smaak.
- Gezichtsproblemen zoals wazig zien.
- Plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme).
- Droge mond.
- Een ontsteking aan de binnenkant van uw mond.
- Een infectie genaamd 'spruw' die uw darmen kan treffen en die wordt veroorzaakt door een schimmel.
- Leverproblemen, waaronder geelzucht, wat een gele huid, donkere urine en vermoeidheid tot gevolg kan hebben.
- Haaruitval (alopecia).
- Huiduitslag bij blootstelling aan zonlicht.
- Gewrichtspijnen (artralgie) of spierpijn (myalgie).
- Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis).
- Verergerde transpiratie (zweeten).

**Zeer zelden voorkomende bijwerkingen**

- Veranderingen in aantallen bloedcellen, waaronder agranulocytose (tekort aan witte bloedcellen).
- Agressiviteit.
- Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties).
- Ernstige leverproblemen leidend tot leverfalen en hersenontsteking.
- Plotselinge zeer ernstige huiduitslag of blaren of loslatende huid. Dit kan gepaard gaan met hoge koorts en gewrichtspijnen (erythema multiforme, Syndroom van Stevens-Johnson, toxische epidermale necrolyse).
- Spierzwakte.
- Vergrote borsten bij mannen.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

**Hoe, wanneer en hoelang?**

**Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?**

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Hoe?**

- Vóór het afmeten de fles omschudden.
- Voor de suspensie kunt u het beste een maatbekertje gebruiken om de juiste hoeveelheid af te meten.

**Wanneer?**

Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

**Hoelang?**

Hoelang u het precies moet gebruiken bepaalt uw arts.

Wanneer dit middel niet helpt of wanneer de klachten zich herhalen, moet u advies vragen aan uw arts.

**Dosis vergeten?****Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?**

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk nadat u eraan denkt. Alleen als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

**Autorijden, alcohol, voeding****Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...  
autorijden, alcohol drinken en alles eten?**

Het is niet waarschijnlijk dat Omeprazol drank van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruik van gereedschappen of machines. Bijwerkingen zoals duizeligheid en problemen met zien kunnen voorkomen. Als u hier last van heeft, mag u niet rijden of machines gebruiken.

**Wisselwerking****Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?**

*Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.* Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit geldt met name voor de volgende middelen:

- middelen tegen angst (zoals diazepam, flurazepam of triazolam);
- anti-epileptica (zoals fenytoïne, hexobarbital);
- middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva), zoals citalopram, imipramine, clomipramine;
- warfarine om het bloed te verdunnen;
- disulfiram (gebruikt om alcoholisme te bestrijden);
- antibiotica (zoals claritromycine, erytromycine, roxitromycine en cyclosporine);
- middelen tegen schimmelinfecties (zoals ketoconazol en itraconazol);
- vitamine B12
- digoxine, een middel dat wordt gebruikt bij hartproblemen.

**Zwangerschap en borstvoeding**

## **Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?**

### **Zwangerschap**

Omeprazol **dient niet** te worden gegeven aan zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, tenzij het voordeel voor de moeder opweegt tegen het risico voor het kind. *Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.*

### **Borstvoeding**

Omeprazol **dient niet** te worden gegeven aan zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, tenzij het voordeel voor de moeder opweegt tegen het risico voor het kind. *Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.*

## **Wanneer niet gebruiken?**

### **Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?**

U mag dit middel niet gebruiken

- wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor omeprazol of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel;
- wanneer u problemen met de lever heeft en het antibioticum claritromycine gebruikt.

*Voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel dient u uw arts te raadplegen wanneer u:*

- peptisch ulcerziekte heeft;
- ernstige lever- of nierproblemen heeft.

Zie voor meer informatie ook de rubrieken 'Bijwerkingen' en 'Zwangerschap en borstvoeding'.

## **Stoppen**

### **Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?**

Wanneer u opeens stopt met het gebruik van omeprazol kunt u bijwerkingen krijgen.

*Raadpleeg uw arts voordat u stopt met dit geneesmiddel.*

## **Samenstelling**

### **Wat zit er in dit medicijn?**

'X'-suspensie bevat per ml (= milliliter) 'x' mg 'X', 'x' mg saccharose, 'x' mg sorbitol en als conserveermiddel methylparahydroxybenzoesaat. Verder bevat de drank citroenzuur-monohydraat.

## **Bewaren**

### **Hoe moet ik het medicijn bewaren?**

Bewaar de suspensie beneden 25 °C, niet in de vriezer. Sluit na gebruik de fles goed af. Dit voorkomt uitdroging en bederf. Onaangebroken is de suspensie houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op het etiket staat. Na aanbreken van de verpakking is de suspensie maximaal 6 maanden houdbaar, maar niet langer dan de uiterste gebruiksdatum die op het etiket staat.

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw apotheker.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door de 'Ziekenhuis apotheek van het Wilhelminaziekenhuis in Assen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op '**maand/jaar**'.