



Onze informatie
speciaal voor u

afdrukdatum: 6-1-2015

Medicijnen bij oorontsteking

sofradex, otosporin, bacicoline-B, terra-cortil + polymyxine-B of door de apotheek bereide oordruppels

**VI-178 ©
SLS/13.12**



Wat u moet weten over dit medicijn:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Werkt ontstekingsremmend en doodt bacteriën en soms ook andere micro-organismen in het oor. Hierdoor vermindert de ontsteking en zwelling. | <input type="checkbox"/> Zo lang gebruiken als de dokter u heeft verteld (meestal 5 tot maximaal 14 dagen). |
| <input type="checkbox"/> Helpt na 2 tot 3 dagen. | <input type="checkbox"/> Bijwerkingen, zoals een prikkelend of branderig gevoel, gaan vanzelf weer over. |

Hoe helpen de medicijnen?

Deze oordruppels worden meestal gebruikt bij een infectie in de uitwendige gehoorgang (het buitenoor). Infecties kunnen worden veroorzaakt door bacteriën, schimmels en gisten. U kunt last hebben van pijn, jeuk, zwelling en schilfering (kleine stukjes huid die loslaten).

Soms worden deze oordruppels ook gebruikt bij een loopoor. Er stroomt dan pus (vloeistof) uit het oor. Bij een loopoor is het middenoor ontstoken en ontstaat er een klein gaatje in het trommelvlies (vliesje dat de geluidstrillingen opvangt). Dit gaat vanzelf weer dicht.

Deze oordruppels werken ontstekingsremmend en doden de veroorzaker van de infectie. Ook verminderen ze de zwelling en de jeuk.

De medicijnen worden soms ook gebruikt bij mensen met buisjes in de oren.

Hoe lang moet u de medicijnen gebruiken?

Gebruik het medicijn zo lang als de dokter u heeft verteld. Meestal is dat 5 tot maximaal 14 dagen. Zijn uw klachten binnen 5 dagen over? Gebruik het medicijn dan nog 3 dagen lang. Dat de klachten weg zijn, betekent namelijk nog niet dat alle bacteriën verdwenen zijn.

Wanneer merkt u dat de medicijnen helpen?

Na 2 tot 3 dagen helpen de oordruppels tegen de pijn en de jeuk. Gaat het na 4 dagen nog niet beter? Bel dan uw dokter.

Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen)?

De meeste medicijnen kunnen onbedoelde klachten geven. We noemen dit bijwerkingen. Direct na het druppelen kunt u last krijgen van een prikkelend of branderig gevoel.

Sommige mensen zijn overgevoelig voor stoffen in de oordruppels. U merkt dat aan meer jeuk, roodheid en zwelling in het oor. Bel dan uw dokter.

Hoe moet u de medicijnen gebruiken?

- Vraag een ander om het medicijn in uw oor te druppelen (als dat mogelijk is).
- Maak het buitenoor voor het druppelen goed schoon en droog. Gebruik geen zeep!
- Hou het druppelflesje een tijdje in uw hand om de vloeistof op te warmen.
- Ga op uw zij liggen of hou uw hoofd opzij gebogen. Trek het oor naar boven en naar achteren. Trek bij kinderen jonger dan 6 jaar het oor naar onderen en naar achteren.
- Laat de druppels in het oor vallen. Zorg dat de druppelaar niets aanraakt, anders bederft de vloeistof sneller.
- Hou na het druppelen het hoofd 2 minuten opzij gebogen.
- Als uw dokter u andere instructies heeft gegeven dan moet u die volgen.
- Moet u een opgerold gaasje of een oortampon gebruiken? Hou het gaasje of de tampon dan vochtig door regelmatig te druppelen. Verwissel na 1 of 2 dagen.

Medicijnen vergeten?

Duurt het nog langer dan 1½ uur tot de volgende dosis? Druppel dan alsnog. Anders overslaan. Lees ook de bijsluiter of kijk op www.apotheek.nl om te weten wat u moet doen.

Wat kunt u zelf doen?

- Peuter niet in uw oor en gebruik wattenstaafjes of oordoppen zo weinig mogelijk. U kunt hiervan een buitenoorontsteking krijgen.
- Ook zeepresten of haarspray in het oor kunnen een oorontsteking veroorzaken.
- Als u de ontsteking heeft gekregen door zwemmen, dan kunt u voortaan oorvatjes met vaseline of beschermende oordopjes gebruiken.
- Een loopoor verdwijnt meestal vanzelf binnen 2 weken. Bij een loopoor mag u zwemmen, maar niet met het hoofd onder water.
- Heeft u een gehoorapparaat? Laat dan controleren of het goed past.

Lees voor meer informatie ook de bijsluiter.
